
Capítulo 9

Inmunización

9 Inmunización

Descripción:

La inmunización

- es la medida más importante y eficaz que puede proporcionarse a un niño
- ayuda al niño a crear anticuerpos contra microorganismos específicos
- evita que esos microorganismos causen enfermedades graves o complicaciones
- anualmente previene la muerte o la minusvalía de millones de niños en el mundo

Calendario

Las vacunas se administran en forma secuencial en edades específicas, lo que se conoce como calendario vacunal.

- nunca se ha de perder una oportunidad de inmunizar
- el calendario no es rígido. La vacuna se puede dar unos días antes o después de la fecha prevista. En caso de que las visitas del niño no coincidan con las fechas previstas, se debe respetar el intervalo entre las dosis de una misma vacuna.
- debe haber un intervalo mínimo de 4 semanas entre las vacunas
- al atender a un niño revisar siempre la situación vacunal en su cartilla de salud
- subrayar ante la madre la importancia de las vacunas cuando atiende al niño
- la mayoría de las vacunas provocan pequeñas reacciones dolorosas, cutáneas o fiebre moderada debido a la respuesta inmunológica del organismo, lo cual no debe alarmar a los familiares del vacunado

El calendario de vacunas en la RASD (Octubre 2001)

Edad	Vacuna	Observaciones
0-1 mes	BCG + 1ª HB	La 1ª HB tiene que ponerse en las primeras 24 horas, para impedir la transmisión de madre a hijo.
2º mes	VPO + DPT + 2ª HB	
4º mes	VPO + DPT	
6º mes	VPO + DPT + 3ª HB	
9º mes	Sarampión	
18 meses	VPO + DPT	
6 años	VPO + DPT	1º año escolar
11 años	BCG	5º año escolar
14 años	TD	

BCG: Bacillus Calmette-Guerin. Protege a niños menores de 2 años contra la tuberculosis

HB: Hepatitis B. Protege contra la hepatitis B

VPO: Vacuna polio oral. Protege contra la poliomielitis

DPT: protege contra difteria, pertussis (tos ferina o coqueluche) y tétanos

Sarampión: protege contra el sarampión

TD: protege contra difteria y tétanos

recomendaciones específicas:

- para la vía IM en niños menores de 2 años debe utilizarse la cara anteroexterna del muslo
- las vacuna VPO y BCG son sensibles a la luz
- la BCG se debe administrar inmediatamente después de preparar la solución
- la BCG no se administra a niños desnutridos o de peso inferior a 2 kg o con enfermedades sistémicas



9